Varroa Kontrolle



Ab Juni muss monatlich der natürliche Varroa Totenfall kontrolliert werden. Dabei wird die Varroa Schublade für drei Tage eingeschoben. Total Milben / Anzahl Tage = natürlicher Totenfall pro Tag.

Ende Juli sollten nicht mehr als 10 Milben pro Tag und bei Jungvölkern nicht mehr als 5 Milben pro Tag fallen.

Fallen mehr als 30, bzw. 15 beim Jungvolk muss das Volk **SOFORT UND GRÜNDLICH** behandelt werden. Dann findet man im Volk auch meistens bereits Bienen mit deformierten Flügeln (Virus Erkrankung).

Für die Kontrolle der Wirkung der Behandlung gilt das Verhältnis 1:200.
Findet man bei der Kontrolle 10 Milben pro Tag, dann befinden sich im Volk etwa 2’000 lebende Milben.

Vergleich verschiedener Varroa Konzepte

	Hans Beer	Deutsche Institute Schweizer Bienenzeitung
März	3-maliges VarroMed träufeln im Abstand von genau 6 Tagen	
April - Juni		Drohnenbrut schneiden
Ende Juli / Anfang August	6 wöchige Behandlung mit Api Life VAR	1. Behandlung mit Ameisensäure Langzeitverdampfer
September		2. Behandlung mit Ameisensäure Langzeitverdampfer
Oktober	je nach Befall nochmals VarroMed träufeln	
Dezember (brutfrei)	VarroMed träufeln	Oxalsäure träufeln
Fazit	Bienenverträglicher und auch Anwenderfreundlicher.	Sehr aggressiv, schädigt offene Brut und verätzt den jungen Bienen das Haarkleid. Vitalität der Königin wird mit jeder Ameisensäure Behandlung geringer.

WICHTIG: Hör nicht auf andere Imker - zähle deine eigenen Varroen!